



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049

**„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”**

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

---

**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН  
ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА”**

---

**ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ**

**КАТЕДРА „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,  
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”**

**УПРАЖНЕНИЕ № 4**

**ЗА ДИСТАНЦИОННА САМОПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИ-**

**НА**

**„ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”**

**ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”**

**ТЕМА: „ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА. ХЕРПЕС ВИРУСНИ  
ИНФЕКЦИИ, МОЛУКСУМ КОНТАГИОЗУМ”**

**РАЗРАБОТИЛ: Доц. д-р Ив. Йорданова**

**Гр. Плевен**

**2013 год.**

---

***Инвестира във вашето бъдеще!***

*„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет - Плевен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.”*

***Дерматовирози от херпесната група:***

Herpes simplex – I и II тип херпесен вирус. ФОРМИ: Gingivostomatitis herpetica (при имунен дефицит), Eczema herpeticum (суперпонирана херпетична инфекция върху екзема)

Herpes zoster – III тип херпесен вирус. ФОРМИ: Herpes zoster intercostalis, Herpes zoster ophthalmicus.

Pityriasis rosea – VII тип херпесен вирус

Sarcoma Kaposi – VIII тип херпесен вирус

***Дерматовирози от папиломната група:***

Verucae vulgares – локализация по гърба на китките, пръстите на ръцете и ходилата

Verucae plane juvenilis – локализация по лицето предимно у деца и младежи

Condylomata accuminata – локализация по полулигавиците на външните гениталии, ануса. ДД:

Condilomata lata при Lues II recidiva. Онкогенни щамове Human Papiloma Viruses (HPV)

***Дерматовирози от вариолната група:***

Molluscum contagiosum – единични или множествени туморчета от просено до царевично зърно, с цвета на кожата, транспарентни и с хлътване в центъра.

***Системно и локално лечение на дерматовиروزите от херпесната, папиломната и вариолната група.***