



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0049

„Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Европейски социален фонд

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА”

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

**КАТЕДРА „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ,
ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”**

УПРАЖНЕНИЕ № 7

**ЗА ДИСТАНЦИОННА САМОПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИ-
НА**

„ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ”

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

**ТЕМА: „МИКОБАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА. ТУБЕРКУ-
ЛОЗА, ЛЕПРА”**

РАЗРАБОТИЛ: Доц. д-р Ив. Йорданова

Гр. Плевен

2013 год.

Инвестира във вашето бъдеще!

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет - Плевен носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.”

Tbc cutis – причинява се от Mycobacterium Tuberculosis (Robert Koch – 1882 г. Typus Humanus, Typus Bovinus, 30 антигенни субстанции (туберкулопротеини) Бавен тип алергична реакция, Проби на Pirquet и Mantoux

Разпространение – лимфогенен, хематогенен, по съседство и интраканаликуларен път.

Tbc Класификация

Първична и вторична

Огнищна и дисеминирана

Кожна туберкулоза

TBC cutis primaria vera

TBC cutis luposa

TBC cutis verrucosa

TBC cutis colliquativa

TBC cutis miliaris ulcerosa

Туберкулиди

TBC cutis papulo-necrotica

TBC cutis lichenoides

TBC cutis indurativa

Туберкулидите са генерализирани, симетрични кожни ерупции при пациенти със системна Тбс в добро общо състояние, без оплаквания, Хиперсенситивност, Позитивни туберкулинови реакции. Най-често хематогенни разсейки от първичното огнище и лимфните възли. Най-често негативни културелни изследвания от кожни лезии. Заздравяват след лечение с туберкулостатици в комбинация за срок 6 месеца – 1 година.

Лепра - Mycobacterium Leprae, Armauer Hansen – 1873

Gr + , морфологично сходен с Mycobacterium Tuberculosis

Интрацелуларно, по-рядко екстрацелуларно или подредени като “цигари в пакет”

Заразяването става в детска възраст

Размножават се на мястото на проникване

Разпространяват се в периневралната обвивка и кожата.

Могат да проникнат и в кръвта.

Инкубационен период – от 3 месеца до 30 години.

4 типа:

- Lepra indeterminata
- Lepra tuberculoides
- Lepra lepromatosa
- Lepra borderline

Клинична картина - Лепром, Полиморфен екзантем, Парези и парализи, Мutilации.

Лечение: Dapsone (Avlosulfon), Rifampin (Rimactane), Prednisone, Thalidomide (Thalomid) 6 месеца – 1 година.