

ТЕСТ ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ
СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ПАТОЛОГИЧНО РАЖДАНЕ

Име.....фак. №.....

1. Кога може да се мисли за удължена латентна фаза при *prima para*?
 - a) когато латентната фаза е удължена повече от 2 часа
 - b) когато латентната фаза е удължена повече от 10 часа
 - c) когато латентната фаза е удължена повече от 15 часа
 - d) когато латентната фаза е удължена повече от 20 часа
2. Какво е поведението при удължаване на латентната фаза?
 - a) bed rest
 - b) терапевтичен сън
 - c) Окситоцинова инфузия
3. Колко степени на тесен таз познавате в зависимост от дължината на *Conjugata vera obstetrica*?
 - a) Две
 - b) Три
 - c) Четири
 - d) Пет
4. При какво стеснение на таза вагиналното раждане е абсолютно противопоказано?
 - a) първа и втора степен
 - b) втора и трета степен
 - c) трета и четвърта степен
5. При коя степен на стеснение на таза е възможен опит за вагинално раждане?
 - a) при втора степен
 - b) при трета степен
 - c) при първа степен
 - d) при четвърта степен
6. Какъв е размерът на *Distantia spinarum*?
 - a) 20 – 22 см.
 - b) 22 – 24 см
 - c) 24 – 25 см.
 - d) 25 – 26 см.
7. Разположението на пъпната връв до или пред предлежащата част на плода след пукането на околоплодния мехур се нарича:
 - a) предлежание на пъпната връв
 - b) пролапс на пъпната връв

8. Посочете 6 причини за преждевременно раждане:

-
-
-
-
-
-

9. При кое от следните състояния предварителната подготовка на средствата за реанимация са основно акушерско задължение:

- a) преждевременно раждане
- b) многоплодна бременност
- c) подготовка за SC
- d) пукнат околоплоден мехур

Кое от посочените твърдения за коя от ситуациите е съответно вярно?

10.Индукция на раждането -	А. Изтичане на околоплодна течност ex utero
11.Едър плод -	Б. Раждане, което протича затруднено, поради механични или функционални фактори
12.Епизиотомия -	В. Раждане преди 38 г.с.
13.Преносена бременност -	Г. Несъответствие между вътрешните размери на таза и големината на плода.
14.Dystocia -	Д. Активно стимулиране на маточни контракции, преди тяхното спонтанно проявяване
15.Предтерминно раждане -	Е. Разрязване на перинеума с цел улесняване експулсията на плода
16.Пелви-фетална диспропорция -	Ж. Бременност, продължаваща повече от 42 г.с.
17. Пукнат околоплоден мехур -	З. Новородено с тегло над 4000 гр.

18.Посочете 5 причини за функционална дистокция по време на раждането:

-
-
-
-
-

