



Европейски съюз



Европейски социален фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО“

ЗА СТУДЕНТИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕН И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

ЗАДАЧА 3.

РАЗДЕЛ „ВИДОВЕ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ“

През 1965г. Британския комитет по лекарствена безопасност получил 249 съобщения за странични реакции и 16 доклада за смъртни случаи при жени, вземащи орални контрацептиви. Започнато е епидемиологично проучване на въпроса дали жените, ползващи орална контрацепция имат по-висок риск от развитие на тромбоемболизъм. Включени са 84 жени с венозна тромбоза и белодробен емболизъм и 168 лица без заболяване. Всички те са били избрани сред пациентките в една и съща болница и е използван социологическият метод интервю. Резултатите показали, че 50% от случаите и 14% от контролите са ползвали орални контрацептиви.

1. Определете вида на проучването.
2. Посочете поне две възможности за систематични грешки и обосновайте отговора си.
3. Изчислете подходяща мярка за силата на връзката между употребата на орални контрацептиви и белодробния емболизъм.

а) Курсовата задача се оформя с титулна страница по образец.

б) Файлът на задачата се изпраща по ел. поща, без да се помества в някакъв архив, до преподавателя на адрес avelkova@mu-pleven.bg, като се използват **ЛИЧНИТЕ ПОЩИ** от системата за ДО!

РАЗРАБОТИЛ: Гл.ас. Стела Георгиева